

# 地奈德乳膏联合复方多粘菌素 S 软膏治疗慢性湿疹疗效观察

李农生<sup>#</sup>, 漆根全<sup>#</sup>, 罗来华<sup>!</sup>

(<sup>#</sup>江西省上高县皮防所, 江西 上高 %: \$""; <sup>!</sup>江西省皮肤病医院, 江西 南昌 %""#%)

**【摘要】 目的** 观察比较地奈德乳膏联合复方多粘菌素 S 软膏与单独使用地奈德乳膏治疗慢性湿疹的疗效。**方法** 治疗组: 例使用地奈德乳膏和复方多粘菌素 S 软膏 1 次/d; 对照组: 例单独使用地奈德乳膏 1 次/d; 两组均用 1 周。**结果** 治疗组与对照组有效率分别为 85.71%、66.67%, 两组有效率比较差异有统计学意义 ( $P < 0.05$ )。**结论** 地奈德乳膏和复方多粘菌素 S 软膏治疗慢性湿疹效果较好, 无明显不良反应。

**【关键词】** 慢性湿疹; 地奈德乳膏; 复方多粘菌素 S 软膏; 治疗

中图分类号: R758.61; R758.62 文献标识码: B DOI: 10.3969/j.issn.1674-4763.2013.01.010

慢性湿疹是皮肤科常见病, 本所自 2008 年 8 月 > 2012 年 8 月应用地奈德乳膏(重庆华邦制药股份有限公司)和复方多粘菌素 S 软膏(浙江日升昌药业有限公司)治疗慢性湿疹取得满意疗效。现将结果报告如下:

## 1 资料与方法

**1.1 一般资料** 所有病例均来源于本所门诊皮肤科, 入选的 30 例患者均为慢性湿疹的典型表现<sup>[1]</sup>。30 例患者随机分为两组, 治疗组: 例, 男 15 例, 女 15 例, 平均年龄 32.5 岁(25~45 岁), 平均病程 12 个月(3 个月~20 年); 对照组: 例, 男 15 例, 女 15 例, 平均年龄 31.5 岁(25~45 岁), 平均病程 11 个月(3 个月~20 年); 两组患者的性别、年龄、病程及症状比较差异无统计学意义。皮损均局限, 面积约硬币至成人手掌大小不等。排除下列情况: ①对地奈德乳膏、复方多粘菌素 S 软膏过敏者; ② 1 个月内系统或局部使用免疫抑制剂者; ③皮损广泛且合并严重内脏疾病者; ④