



病程 3 月~3 年,平均病程(6.4±4.5)月。2 组患者年龄、病程、皮损分布比较,差异无统计学意义( $P > 0.05$ ),具有可比性。诊断标准:1) 青春期开始发病,皮损对称分布,多见于面部、背部、上胸等部位;2) 皮损为黑头粉刺、毛囊性丘疹、脓疱、囊肿、瘢痕结节,呈慢性过程,常伴有皮脂溢出。

1.2 治疗方法 治疗组患者给予复方多黏菌素 B 软膏(浙江日升昌药业)涂于患处,并轻轻按摩 2 次/d,用药过程中避免药物接触眼、口等部位,同时口服裸花紫珠胶囊(江西杏林白马药业)3 次/d,3 粒/d,疗程共 4 周。对照组患者仅给予复方多黏菌素 B 软膏治疗,用药方法同治疗组。

1.3 疗效标准 痊愈:皮损全部消退,临床症状基本消失,治疗指数 $\geq 90\%$ ;显效:皮损大部分消退,临床症状显著减轻,治疗指数 $\geq 60\%$ ;好转:皮损部分消退,临床症状有所减轻,治疗指数 $\geq 20\%$ ;无效:皮损消退不明显,临床症状减轻不显著,治疗指数 $< 20\%$ 。

1.4 统计学方法 数据分析采用 SPSS 10.0 软件统计,